

第5章 大気環境



燃料電池車の展示(環境フェア)

第5章 大気環境

1 大気汚染の概要

大気汚染は、主に化石燃料の燃焼等により発生します。その原因物質としては、工場などの重油の燃焼によって発生する硫黄酸化物、工場や自動車から排出される窒素酸化物や浮遊粉じん、自動車排出ガス中に含まれる一酸化炭素、有機溶剤使用施設や自動車から排出される炭化水素及び太陽の照射を受けて、炭化水素類、窒素酸化物等が化学変化を起こし二次的に発生する光化学オキシダントなどがあります。また、最近では地球の温暖化、ダイオキシン類、酸性雨、オゾン層破壊等の問題が取り上げられています。

刈谷市では、かりがね小学校と依佐美中学校及び東境町に大気汚染測定局を設置し、自動測定機により常時監視を行っています。また、寿町にも、愛知県が大気汚染測定局を設置し、常時監視を行っています。

今後とも、自動測定によるほか、降下ばいじん量、酸性雨の調査や工場への立入調査を行ない、積極的に大気汚染防止に対処していく予定です。

また、ダイオキシン類の環境調査の結果については、第9章で記載しています。

(1) 大気汚染に係る環境基準

環境基準は、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましいとされる環境上の条件として定められた基準です。環境基準は行政上の目標となるべきものであり、汚染度の高い地域ではその早期達成が、また、汚染度の低いところではその維持保全が必要となります。

現在設定されている大気汚染に係る環境基準は次のとおりです。

物質	二酸化硫黄	二酸化窒素	一酸化炭素	浮遊粒子状物質	光化学オキシダント
環境	0.04ppm 0.1ppm	0.04ppm ～ 0.06ppm	10ppm 20ppm	0.10mg/m ³ 0.20mg/m ³	0.06ppm
上の条件	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。	1時間値の1日平均値が0.10 mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20 mg/m ³ 以下であること。	1時間値が0.06ppm以下であること。

2 大気測定結果


(1) 大気汚染測定局及び測定項目

地点番号	測定局	測定項目						
		SO ₂	NO _x	SPM	OX	風向 風速	酸性 雨	その他
①	かりがね小学校	○	○			○		○ 降下ばいじん量
②	刈谷市寿町 [※]		●	●	●	●	○	
③	依佐美中学校	○	○			○		○ 降下ばいじん量 [※]
④	東境町		○	○		○		○ 騒音

●県調査 ○市調査

※¹ 刈谷市役所の測定局は、新庁舎建設に伴い刈谷市寿町に移設されました。

※² 降下ばいじん測定は、双葉小学校の校舎建て替えに伴い依佐美中学校に移設されました。



〔測定項目と測定方法〕

測定項目	測定方法
二酸化硫黄 (SO ₂)	紫外線吸光法
窒素酸化物 (NO _x)	化学発光法
{ 二酸化窒素 (NO ₂) 一酸化窒素 (NO) }	ザルツマン試薬を用いる 吸光光度法 (刈谷市寿町)
浮遊粒子状物質 (SPM)	β線吸収法
光化学オキシダント (OX)	中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法
降下ばいじん量	デポジット・ゲージ法
風向・風速	超音波パルス式
酸性雨	1降水全量採取法

(2) 二酸化硫黄

二酸化硫黄の環境基準

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

環境基準の長期的評価

年間にわたる1日平均値の高い方から2%の範囲にある値を除外した値が0.04ppmを超えないことに加え、1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。

ア 自動測定機による二酸化硫黄測定結果

二酸化硫黄は、硫黄分を含んだ燃料を燃焼する際、燃料中に含まれる硫黄分が二酸化硫黄となり大気中に放出されることが主な発生の原因となっています。近年、工場や事業所等では、使用する燃料を高硫黄重油から硫黄含有量の少ない低硫黄重油、灯油及びガスへの転換が進んだことにより、環境基準を大きく下回っています。

イ 二酸化硫黄経年変化

かりがね小学校

年度	項目 有効測定日数	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の2%除外値 (ppm)	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 (有×・無○)	環境基準の適否 (適○・否×)
				(時間)	(%)	(日)	(%)				
17	363	8687	0.001	0	0	0	0	0.046	0.004	○	○
18	359	8611	0.001	0	0	0	0	0.045	0.004	○	○
19	364	8690	0.001	1	0	0	0	0.284	0.004	○	○
20	360	8616	0.001	0	0	0	0	0.065	0.003	○	○
21	364	8686	<0.001	0	0	0	0	0.019	0.002	○	○
22	364	8687	<0.001	1	0	0	0	0.142	0.002	○	○
23	366	8731	<0.001	0	0	0	0	0.017	0.002	○	○
24	364	8688	0.000	0	0	0	0	0.012	0.002	○	○

依佐美中学校

年度	項目 有効測定日数	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の2%除外値 (ppm)	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 (有×・無○)	環境基準の適否 (適○・否×)
				(時間)	(%)	(日)	(%)				
17	363	8687	0.001	0	0	0	0	0.046	0.004	○	○
18	363	8672	0.001	0	0	0	0	0.018	0.005	○	○
19	365	8708	0.001	0	0	0	0	0.017	0.003	○	○
20	362	8633	0.001	0	0	0	0	0.023	0.003	○	○
21	364	8690	<0.001	0	0	0	0	0.021	0.002	○	○
22	364	8711	0.001	0	0	0	0	0.019	0.003	○	○
23	366	8736	<0.001	0	0	0	0	0.013	0.002	○	○
24※	138	3302	0.000	0	0	0	0	0.012	0.002	○	—

※ 測定機の故障により、有効測定局に必要な測定時間に達していないため参考値とする。

(3) 窒素酸化物

二酸化窒素の環境基準

1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

環境基準の長期的評価

年間にわたる1日平均値の低い方から98%に相当する値が0.06ppm以下であること。

ア 自動測定機による二酸化窒素測定結果

二酸化窒素については、測定値は0.06ppm未満であり、環境基準に適合しました。

窒素酸化物は、工場からの排出だけでなく、自動車排出ガスの影響を多分に受けているため、個々の自動車に対する排出ガス規制に加えて、物流対策や交通流対策等、総合的施策を推進することが望まれます。そうした中、ハイブリッド自動車や天然ガス自動車などの低公害車の技術研究、普及も推し進められています。刈谷市では低公害車購入費補助事業を平成11年度から実施しています。また、平成14年度から16年度まで最新規制適合車早期代替促進費補助事業を実施し、NOx・PM法の定める排出基準を満たさない自動車の早期の買い換え促進に努めました。

自動車は私達にとって必要度の高いものですが、一人ひとりがエコドライブを心がけることによって、汚染が少なくなるよう努力することも大切です。

イ 二酸化窒素経年変化

かりがね小学校

年度	項目	有効測定日数 (日)	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の年間98%値 (ppm)	環境基準の適否 (適○・否×)
					(日)	(%)	(日)	(%)			
17		363	8677	0.023	0	0	14	3.9	0.096	0.043	○
18		359	8602	0.023	0	0	8	2.2	0.073	0.040	○
19		363	8680	0.021	0	0	5	1.4	0.077	0.039	○
20		333	7961	0.020	0	0	2	0.6	0.073	0.037	○
21		350	8386	0.006	0	0	2	0.6	0.201	0.031	○
22		305	7290	0.018	0	0	3	1.0	0.062	0.036	○
23		339	8089	0.017	0	0	7	2.1	0.091	0.039	○
24		261	6251	0.017	0	0	3	1.0	0.069	0.037	○

刈谷市寿町（平成19年度までは刈谷市役所）

年度	項目	有効測定日数 (日)	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の年間98%値 (ppm)	環境基準の適否 (適○・否×)
					(日)	(%)	(日)	(%)			
17		365	8726	0.029	1	0.3	57	15.6	0.107	0.051	○
18		362	8697	0.028	0	0	53	14.6	0.082	0.048	○
19		366	8731	0.028	0	0	39	10.7	0.081	0.046	○
20		360	8633	0.019	0	0	3	0.8	0.069	0.038	○
21		363	8629	0.018	0	0	4	1.1	0.070	0.036	○
22		361	8621	0.017	0	0	4	1.1	0.062	0.037	○
23		346	8295	0.016	0	0	5	1.4	0.064	0.037	○
24		359	8594	0.015	0	0	1	0.3	0.059	0.035	○


依佐美中学校

年度	項目 有効測定日数	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の年間98%値 (ppm)	環境基準の適否 (適○・否×)
				(日)	(%)	(日)	(%)			
17	363	8675	0.021	0	0	13	3.6	0.085	0.042	○
18	348	8344	0.021	0	0	7	2.0	0.119	0.039	○
19	237	5695	0.020	0	0	5	2.1	0.068	0.039	○
20	362	8548	0.018	0	0	1	0.3	0.066	0.035	○
21	364	8689	0.016	0	0	1	0.3	0.061	0.032	○
22	364	8682	0.016	0	0	1	0.3	0.060	0.033	○
23	364	8700	0.015	0	0	4	1.1	0.065	0.034	○
24※	128	3097	0.010	0	0	0	0.0	0.049	0.025	—

※ 測定機の故障により、有効測定局に必要な測定時間に達していないため参考値とする。

東境町

年度	項目 有効測定日数	測定時間 (時間)	年平均値 (ppm)	日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		1時間値の最高値 (ppm)	日平均値の年間98%値 (ppm)	環境基準の適否 (適○・否×)
				(日)	(%)	(日)	(%)			
17	362	8675	0.022	0	0	9	2.5	0.111	0.042	○
18	360	8666	0.023	0	0	6	1.7	0.079	0.039	○
19	358	8642	0.021	0	0	4	1.1	0.117	0.037	○
20	352	8542	0.020	0	0	1	0.3	0.089	0.036	○
21	357	8582	0.019	0	0	2	0.6	0.087	0.034	○
22	356	8600	0.017	0	0	0	0	0.074	0.033	○
23	364	8699	0.017	0	0	0	0	0.072	0.033	○
24	362	8676	0.018	0	0	3	0.8	0.080	0.037	○



ウ 年間の窒素酸化物 (NO+NO₂) の測定値の状況

(ア) 年間測定結果

測定局	区分 測定項目	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値が0.06ppmを超えた日数と割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数と割合		1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値 NO _x (NO+NO ₂)
		(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(%)
かりがね小学校	一酸化窒素 (NO)	287	6876	0.007	—	—	—	—	0.180	0.038	—
	二酸化窒素 (NO ₂)	287	6876	0.017	0	0	3	1.0	0.069	0.037	—
	窒素酸化物 (NO+NO ₂)	287	6876	0.024	—	—	—	—	0.226	0.070	69.1
刈谷市寿町	一酸化窒素 (NO)	359	8594	0.004	—	—	—	—	0.106	0.023	—
	二酸化窒素 (NO ₂)	359	8594	0.015	0	0	1	0.3	0.059	0.035	—
	窒素酸化物 (NO+NO ₂)	359	8594	0.019	—	—	—	—	0.15	0.056	79.4
依佐美中学校※	一酸化窒素 (NO)	128	3097	0.004	—	—	—	—	0.084	0.012	—
	二酸化窒素 (NO ₂)	128	3097	0.010	0	0	0	0	0.049	0.025	—
	窒素酸化物 (NO+NO ₂)	128	3097	0.014	—	—	—	—	0.096	0.031	72.7
東境町	一酸化窒素 (NO)	362	8676	0.011	—	—	—	—	0.171	0.043	—
	二酸化窒素 (NO ₂)	362	8676	0.018	0	0	3	0.8	0.080	0.037	—
	窒素酸化物 (NO+NO ₂)	362	8676	0.029	—	—	—	—	0.214	0.070	62.7

※ 測定機の故障により、有効測定局に必要な測定時間に達していないため参考値とする。

(イ) 窒素酸化物 (NO+NO₂) の経年変化

(単位：ppm)

地点	年度	18	19	20	21	22	23	24
		NO	0.013	0.012	0.011	0.013	0.007	0.008
かりがね小学校	NO ₂	0.023	0.021	0.020	0.006	0.018	0.017	0.017
	NO ₂ /NO+NO ₂	63.9%	64.5%	65.2%	33.7%	72.0%	66.4%	69.1%
	NO	0.017	0.015	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004
刈谷市役所	NO ₂	0.028	0.028	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015
	NO ₂ /NO+NO ₂	61.7%	62.7%	72.8%	76.9%	78.4%	75.5%	79.4%
	NO	0.009	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.004※
依佐美中学校	NO ₂	0.021	0.020	0.018	0.016	0.016	0.015	0.010※
	NO ₂ /NO+NO ₂	69.2%	72.3%	71.0%	75.4%	76.6%	73.3%	72.7%※
	NO	0.016	0.015	0.015	0.012	0.012	0.012	0.011
東境町	NO ₂	0.023	0.021	0.020	0.019	0.017	0.017	0.018
	NO ₂ /NO+NO ₂	59.3%	59.4%	56.9%	60.8%	59.1%	59.8%	62.7%

※ 測定機の故障により、有効測定局に必要な測定時間に達していないため参考値とする。

(4) 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質の環境基準

1時間値の1日平均値が0.10mg/m³以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m³以下であること。

環境基準の長期的評価

年間にわたる1日平均値の高い方から2%の範囲にある値を除外した値が0.10mg/m³以下を超えないことに加え、1日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続しないこと。

ア 自動測定機による浮遊粒子状物質測定結果

浮遊粒子状物質は、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が10μm（1mの100万分の1）以下のものをいいます。浮遊粒子状物質は、工場の燃焼に伴い発生するすすや自動車の排出ガス、また土壌の飛散などの自然界からも影響を受けています。

イ 浮遊粒子状物質経年変化

刈谷市寿町（平成19年度までは刈谷市役所）

年度	項目 有効測定日数	測定時間 (時間)	年平均値 (mg/m ³)	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値 (mg/m ³)	日平均値の2%除外値 (mg/m ³)	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無 (有×・無○)	環境基準の適否 (適○・否×)
				(時間)	(%)	(日)	(%)				
17	363	8710	0.032	0	0	1	0.3	0.196	0.083	○	○
18	365	8726	0.030	5	0.1	0	0	0.296	0.072	○	○
19	365	8736	0.027	11	0.1	4	1.1	0.310	0.067	×	×
20	362	8678	0.024	0	0	0	0	0.156	0.055	○	○
21	362	8689	0.022	4	0	0	0	0.442	0.048	○	○
22	362	8685	0.021	0	0	0	0	0.164	0.054	○	○
23	363	8713	0.022	1	0	2	0.6	0.202	0.051	×	×
24	357	8618	0.021	0	0	0	0	0.161	0.056	○	○

東境町

年度	項目 有効測定日数	測定時間 (時間)	年平均値 (mg/m ³)	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値 (mg/m ³)	日平均値の2%除外値 (mg/m ³)	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無 (有×・無○)	環境基準の適否 (適○・否×)
				(時間)	(%)	(日)	(%)				
20	365	8742	0.014	0	0	0	0	0.092	0.037	○	○
21	365	8745	0.013	2	0	0	0	0.637	0.033	○	○
22	364	8739	0.013	0	0	0	0	0.119	0.038	○	○
23	365	8764	0.014	1	0	0	0	0.335	0.035	○	○
24	364	8729	0.014	0	0	0	0	0.066	0.036	○	○

(5) 光化学オキシダント

光化学オキシダントの環境基準

1時間値が0.06ppm以下であること。

環境基準の長期的評価

年間を通じて1時間値が0.06ppm以下に維持されること。

ただし、5時から20時の昼間時間帯について評価する。

ア 自動測定機による光化学オキシダント

自動車からの排出ガスや工場のばい煙に含まれる窒素酸化物やVOC(揮発性有機化合物)が、太陽の紫外線を受けて化学反応を起こすと『光化学オキシダント』と呼ばれる物質が発生し、白くモヤがかかった『光化学スモッグ』と呼ばれる状態になることがあります。この光化学スモッグは、4月から10月にかけて、気温が高くなり、風が弱くて、日差しの強い日に発生しやすくなります。

平成24年度は、刈谷市を含む衣浦区域において、光化学オキシダントが主原因となる光化学スモッグの緊急時の措置による予報等は発令されませんでした。

イ 光化学オキシダント経年変化





刈谷市寿町（平成19年度までは刈谷市役所）

項 年 目 度	昼間測 定日数	昼間測 定時間	昼間年 平均値	昼間の1時間値が0.06ppm を超えた時間数及び日数と その割合				昼間の1時間値が0.12ppm 以上となった時間数及び日数 とその割合				昼間の1 時間値 最高値	環境基準 の適否
	(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(適○・否×)
17	365	5409	0.027	262	4.8	72	19.7	1	0	1	0.3	0.121	×
18	362	5325	0.025	193	3.6	51	14.1	0	0	0	0	0.095	×
19	366	5385	0.027	199	3.7	54	14.8	0	0	0	0	0.106	×
20	365	5430	0.026	167	3.1	42	11.5	0	0	0	0	0.092	×
21	365	5432	0.031	563	10.4	100	27.4	2	0	1	0.3	0.124	×
22	365	5429	0.030	357	6.6	74	20.3	0	0	0	0	0.105	×
23	366	5434	0.028	315	5.8	71	19.3	0	0	0	0	0.109	×
24	361	5357	0.031	302	5.6	67	19.5	0	0	0	0	0.108	×



ウ 光化学スモッグの発令基準

発令区分	発令基準
予報	オキシダント濃度が 0.08ppm 以上となり、かつ、気象状況からみて注意報以上の状態が発生することが予想されるとき
注意報	オキシダント濃度が 0.12ppm 以上となり、かつ、気象状況からみてその状態が継続すると認められるとき
警報	オキシダント濃度が 0.24ppm 以上となり、かつ、気象状況からみてその状態が継続すると認められるとき
重大警報	オキシダント濃度が 0.40ppm 以上となり、かつ、気象状況からみてその状態が継続すると認められるとき

(6) 風配図・月別平均風速



※8月以降は機器故障により欠測




静穏：風力0（風速0.3m/s未満）

(7) 酸性雨測定結果

雨水の pH（水素イオン濃度）は大気中に含まれる二酸化炭素との平衡により、25℃・1気圧の条件下では pH5.6 程度の弱酸性を示すと言われ、pH5.6 以下の雨を一般的に酸性雨と呼んでいます。過去の調査結果では、pH3.5 未満の強い酸性雨は見られませんでした。

ア 水素イオン濃度経年変化



年度	17	18	19	20	21	22	23	24
刈谷市役所	5.0	5.2	5.0	5.0	5.5	6.0	5.0	5.0

イ 月別水素イオン濃度


採取月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
刈谷市役所	4.8	4.5	5.2	4.8	4.9	5.0	5.5	5.9	4.9	4.7	4.5	5.2

(8) 降下ばいじん量測定結果

大気中の粒子物質のうち、比較的大きいものが重力や雨の作用によって、地上に降下したものです。原因は、重油等の燃焼に伴い大気中に放出された物及び、風により舞い上げられた土砂等であり、測定値は、条件（測定場所、気象等）の影響を受けるため基準等は設定されていませんが、5 t/km²・月以下が望ましいとされています。本市においては、いずれの測定局においても年平均値がその数値を下回っています。

ア 降下ばいじん総量経年変化

(t/km²・月)



(単位：t/km²・月)

年度	16	17	18	19	20	21	22	23	24
測定局									
かりがね小学校	2.2	2.6	2.6	2.3	2.2	2.1	0.99	1.55	1.89
双葉小学校	1.8	2.4	2.4	2.2	1.8*	/	/	/	/
依佐美中学校	/	/	/	/	3.1*	2.6	1.0	1.69	1.83

※ 平成 20 年度については、双葉小学校校舎取り壊しに伴い 2 月に依佐美中学校へ移設したため、双葉小学校は 4～12 月の平均値、依佐美中学校は 2～3 月の平均値とした。

イ 月別降下ばいじん総量

(単位：t/km²・月)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
測定局												
かりがね小学校	4.70	2.12	1.58	1.10	1.23	1.56	1.36	1.18	1.28	1.01	1.56	4.05
依佐美中学校	4.27	1.78	1.49	1.06	1.58	1.85	1.47	1.18	1.22	0.91	1.48	3.68

(このページは空白です)